


**Come usarle
nei giardini
e nei parchi:
alcuni
suggerimenti
per un buon
impianto
e suggestioni
di plant design**



Bulbbose

Semplici parterre di bossi possono essere arricchiti da piccole bulbose primaverili per dare un tocco di colore prima della fioritura delle rose.

Laura Pirovano - FOTO: IBC CENTRO INTERNAZIONALE BULBI DA FIORE



Per avere un effetto naturalistico si possono punteggiare i prati con bulbi primaverili impiegando diverse varietà della stessa specie come nell'immagine, che vede la scelta di tulipani neri ('Queen of night'), bianchi ('White triumphator') e rosso vivo ('Menton') oppure con un bel mix di muscari e narcisi come nella seconda fotografia.

Le piante bulbose rappresentano una risorsa molto versatile, sia per le fioriture che coprono quasi l'intero anno sia perché, a seconda dell'impiego, possiamo scegliere bulbi annuali per avere un pronto effetto scenografico, bulbi perenni che ti accompagnano per più stagioni e che seguono il ciclo di sviluppo vegetativo delle erbacee perenni con cui si associano molto bene.

Se infine desideriamo un effetto più naturalistico e spontaneo possiamo impiegare quelle piante che tendono a naturalizzarsi e moltiplicandosi in numero, in condizioni adatte di luce e di drenaggio. A seconda del periodo di fioritura i bulbi si suddividono in tre tipologie, primaverili, estivi e autunnali, ciascuna delle quali presenta caratteristiche e proprietà specifiche che determinano particolari cure orticole.

I bulbi primaverili – la tipologia più nota e diffusa – sono di solito molto rustici data la loro provenienza dalle culture dell'Europa orientale e dell'Asia centrale dove gli inverni sono rigidi; il periodo di piantagione va dalla fine di settembre a metà dicembre ed è preferibile con temperature sotto i 10°C.

Le **bulbose estive**, invece, date le loro origini dalle regioni subtropicali, racchiudono molti generi e specie adatte solo a climi miti e che per questo motivo vanno asportate dal terreno prima del gelo per essere ripiantate la stagione successiva, a fine aprile (con temperature superiori ai 10°C) per poter



Jacqueline van der Kolet e Franz Roosen fanno una dimostrazione del "lasagna planting" ai Giardini di Villa Comunale di Milano, novembre 2010.



Nelle immagini di questa pagina: l'aggiunta di bulbi ad aiuole con erbacee perenni e piccoli arbusti contribuisce a vivacizzare la composizione, rendendola più interessante e dinamica e prolungando il periodo di fioritura. Il trucco, secondo la garden designer olandese Jacqueline Van der Kloet, è di spargere i bulbi primaverili tra le perenni con una media di circa 10-12 tulipani e narcisi per mq, di 30-40 crochi per mq e fino a 50 di scilla e muscari.



Un bel contrasto fra formale e informale è la combinazione di bossi a sfera di differenti dimensioni con un graminacee, geranium e una bella macchia di una nuova varietà di tulipani che tendono facilmente a naturalizzarsi, Tulipa 'Ice stick'.

BULBI PER DIVERSI UTILIZZI

Bulbi che si naturalizzano facilmente: *Allium ursinum*, *Anemone blanda*, *coronaria*, *Colchicum*, *Crocus tomasianum*, *Chionodoxa*, *Galanthus nivalis* (bucaneve), *Hyacinthoides non-scripta* (giacinto selvatico), *Tulipani botanici*.

Bulbi da sottobosco: *Allium ursinum*, *Anemone nemorosa*, *Anemone ranunculoides*, *Arum italicum*, *Colchicum*, *Convallaria majalis*, *Corydalis cava*, *Corydalis solida*, *cyclamen*, *Eranthis*, *Galanthus nivalis*, *Hyacinthoides non-scripta*, *Ornithogalum*.

Nel prato: *Crocus*, *Chionodoxa*, *Galanthus*, *Muscari*, *Scilla*, *narcisi precoci* come *February Gold*, *'Jack Snipe'*, *'Peeping Tom'*, *'Tête-à-Tête'*.

Zone umide: *Arum italicum*, *Camassia*, *Fritillaria meleagris*, *Leucojum aestivum* e *vernum*.

Bulbi con portasemi decorativi: *Allium*, *Fritillaria*, *Muscari*, *Tulipa 'Ontario'*.

Bulbi possono poi essere utilizzati per dare un accento più grafico minimalista e in questo caso le parole chiave sono semplicità, coerenza e bilanciamento; tra i colori più adatti è il bianco, come si può apprezzare nella disposizione in cui è stato creato il nastro sinuoso di tulipani ('Ice stick' e 'Casablanca') e anemoni (*Anemone blanda* 'White splendour') che si snoda tra i bossi.



BULBI ED ERBACEE PERENNI

Da associare ai tulipani: *Amsonia*, *Dicentra*, *Helianthus*, *Geranium*, *Inula*, *Kalimeris*, *Thalictrum*, *Thermopsis*, *Veronica longifolia*, *Veronicastrum*.

Da associare ai giacinti: *Alchemilla*, *Geranium*, *Hosta*, *Nepeta*, *Salvia*, *Teucrium*.

Da associare ai narcisi: *Alchemilla*, *Brunnera*, *Chelone*, *Darmera*, *Geranium*, *Hemoerocallis*, *Hosta*, *Ligularia*, *Lysimachia punctata/ciliata/clethroides*.

avere una fioritura nell'estate seguente.

I **bulbi autunnali**, di numero più limitato (essenzialmente colchici, crochi e ciclamini), possono essere messi a dimora dalla metà di luglio fino alla fine di settembre e hanno il pregio di integrare le poche fioriture di questo periodo dell'anno.

TECNICHE DI PIANTAGIONE

Il terreno più adatto a ospitare bulbose è soffice, ben dissodato e drenato, per evitare la minaccia più grande per questo tipo di piante costituita dal ristagno d'acqua. Il ph ideale si colloca tra 5.5 e 7 e, se inferiore, è necessario aggiungere calce.

Prima dell'impianto è opportuno lavorare il terreno per una profondità di almeno 25 cm; i bulbi, da interrare per una profondità doppia della loro altezza, vanno ricoperti con uno strato di terreno di almeno 10-15 cm e, sopra, il compost per uno spessore di qualche centimetro per mantenere la giusta umidità nel terreno e per migliorarne la struttura. Solo nel caso di un impianto nuovo è necessario aggiungere un fertilizzante granulare o un concime organico pellettato, se il terreno è molto asciutto occorre bagnare bene dopo l'impianto. Per ottenere un aspetto naturale, ad esempio nel prato, è consigliabile lanciare i bulbi a terra e piantarli esattamente dove sono caduti.

Un tipo di piantagione molto interessante soprattutto negli spazi pubblici è quella a **strati (lasagna planting)** che consente di avere lunghi

periodi di fioritura che si succedono nella stessa aiuola. Normalmente lo strato superiore viene dedicato ai bulbi primaverili più precoci (ad esempio anemone blanda, scilla, muscari e tulipani precoci), mentre quello inferiore è destinato ad ospitare bulbose più tardive (narcisi e tulipani). Quando il primo livello è in piena fioritura i bulbi del secondo strato sono pronti ad emergere con le prime foglie e quando i primi sono appassiti l'effetto decorativo è assicurato dagli altri.

CURE ORTICOLE

Le bulbose non richiedono molte cure ma è opportuno seguire qualche accorgimento. Di regola occorre annaffiare i bulbi solo quando il terreno è asciutto, concimare con una fertilizzante granulata a lenta cessione dal momento in cui appaiono i primi boccioli.

Dopo la fioritura è meglio asportare subito i fiori appassiti per non disperdere le energie della pianta sulla produzione di semi, mentre si devono lasciare le foglie sulla pianta fino a che non sono completamente seccate per consentire la prosecuzione del processo di fotosintesi. Per favorire la naturalizzazione dei bulbi è indispensabile una buona e prolungata esposizione delle piante alla luce per almeno 4-5 settimane dopo la fioritura per permettere i processi di sintesi dei carboidrati che nutrono i nuovi embrioni e utilizzare un fertilizzante organico; per questi motivi è bene evitare di piantare bulbose sotto alberi sempreverdi. ▶

BULBI MENO CONSUETI, STAGIONE PER STAGIONE

PRIMAVERA

- *Allium aflatulens*, fiore lilla-porpora aprile-maggio, H. 90 cm, sole-mezz'ombra, bordi di perenni, portasemi decorativi, distanza tra i bulbi 25 cm
- *Allium cristophii*, fiore argento-porpora maggio-giugno, H 30 cm, pieno sole, bordi di perenni, portasemi decorativi, distanza tra i bulbi 30 cm
- *Allium neapolitanum*, fiore bianco aprile-maggio, H 30 cm, pieno sole, bordi di perenni, portasemi decorativi, distanza fra i bulbi 15 cm
- *Allium giganteum*, fiore enorme porpora maggio-giugno, H 170 cm, pieno sole bordi di perenni, portasemi decorativi, distanza tra i bulbi 30 cm
- *Camassia cuscikii*, liliacea con fiore blu chiaro maggio-giugno, H 60-80 cm, sole e mezz'ombra, come coprisuolo e giardino roccioso, distanza tra i bulbi 20 cm
- *Eremurus*, liliacea, fiore bianco, rosa, giallo o arancio maggio-luglio, H 100-250 (a seconda della specie o varietà), pieno sole, rustico ma da proteggere in inverno, in fondo ai bordi di perenni, distanza tra i bulbi 60 cm
- *Fritillaria meleagris*, liliacea fiore bianco o porpora aprile-maggio. H 25 cm, sole o ombra parziale, sotto alberi e arbustie giardino roccioso, distanza tra i bulbi 5 cm
- *Hyacinthoides non scripta* (giacinto selvatico), fiore blu o bianco o rosa in maggio, H 20-30 cm, ombra parziale, tende a naturalizzarsi, per sottobosco, distanza tra i bulbi 8 cm
- *Ipheion uniflorum*, fiore bianco o blu aprile-giugno, H 10-20 cm, pieno sole, per giardino roccioso, distanza tra i bulbi 5 cm
- *Leucojum*, fiore bianco febbraio marzo (vernum), aprile-maggio (aestivum), H 40 cm, ombra parziale, sotto alberi e arbusti e giardino roccioso, distanza tra i bulbi 12cm
- *Netascordum siculum* o *Allium siculum*, fiore bianco e porpora in grandi campane maggio-giugno, H 90-100 cm, sole/ombra parziale, bordi di perenni, distanza tra i bulbi 20 cm

ESTATE

- *Bletilla*, orchidacea rustica, fiore rosa o bianco giugno-luglio, H 20 cm, mezz'ombra
- *B. striata* fiore rosa, *striata* Albostrciata con foglie variegata, distanza tra i bulbi 10 cm
- *Crocsmia*, iridacea, fiore giallo, rosso o arancio agosto-settembre, H 60-90 cm, sole
- varietà: 'Meteor', giallo-arancio; 'Lucifer' rosso vivo, 'Red King' rosso con centro arancio, sole, bordi di perenni, distanza tra i bulbi 10 cm
- *Dahlia 'Bishop of Llandaff'*, fa parte del gruppo delle dalle a fiore di peonia, fiore rosso scuro con fogliame molto decorativo luglio-settembre, H 70-100 cm, sole, distanza tra i bulbi 45 cm
- *Galtonia candicans* (giacinto estivo), liliacea, fiore campanulato bianco con striature verdi agosto-settembre, H 100 cm, sole, abbastanza rustica, bordi di perenni, distanza tra i bulbi 20 cm
- *Liatris spicata*, fiore a spiga porpora luglio-agosto, H 75 cm, sole, bordi di perenni, suolo umido, distanza tra i bulbi 15-20 cm
- *Nerina bowdenii*, famiglia degli Amaryllis, ombrella di fiori nastriformi rosa pallido, settembre-ottobre, H 45 cm, sole, non rustica, adatta a vaso, distanza tra i bulbi 20 cm
- *Ornithogalum dubium*, liliacea, fiore arancio luglio-settembre, H 20 cm, sole, adatta al vaso, distanza tra i bulbi 8-12 cm
- *Ornithogalum saundersiae*, fiore globoso e compatto bianco con centro nero luglio-settembre, H 100 cm, sole e terreno umido, per bordi di perenni e per vasi, distanza tra i bulbi 8-12 cm
- *Schizostylis coccinea*, iridacea, fiore stellato in racemi dal rosa al rosso, H 50 cm, sole e riparo dai venti freddi, adatta al vaso, distanza tra i bulbi 15-30 cm
- *Tulbaghia violacea*, famiglia degli Amaryllis, fiore a ombrella con fiori stellati azzurro-lavanda o bianco-aranciato dalla tarda primavera all'estate, H 50 cm, non rustica, distanza tra i bulbi 15-30 cm

AUTUNNO

- *Colchicum autumnale*, uno dei primi a fiorire agli inizi di settembre con piccoli fiori rosa acceso (ma ci sono cultivar bianche e anche a fiore doppio), H 15-20 cm, sole e ombra parziale, distanza tra i bulbi 15 cm
- *Colchicum cilicicum*, fiorisce a fine settembre con fiore violetto delicatamente profumato, H 15-20 cm, sole e ombra parziale, distanza tra i bulbi 15 cm
- *Colchicum 'Lilac wonder'*, una cultivar che fiorisce in ottobre con petali ametista violetto
- *Crocus*: diverse specie hanno fioritura autunnale tra cui goulimy, pulchellus, speciosus; rispetto ai crochi primaverili hanno caratteristiche particolari di colore forma, i fiori sono bianchi, lilla o blu, da settembre a novembre, H 10-15 cm, sole e ombra parziale, distanza tra i bulbi 10 cm.
- *Cyclamen neapolitanum*, fiore rosa acceso, rosapallido o bianco agosto-settembre, H 10 cm, ombra parziale, distanza tra i bulbi 15 cm.